

## Prova final de Matemática - 3.º ciclo (2015, 1.ª fase)

Proposta de resolução



### Caderno 1

1.

- 1.1. Os alunos que têm uma altura inferior a 155 cm são os que medem 150 cm ou 154 cm. Assim, o número de alunos com altura inferior a 155 cm é  $6 + 3 = 9$

Logo, existem 9 casos favoráveis e 25 casos possíveis, pelo que, recorrendo à Regra de Laplace, a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter altura inferior a 155 cm é

$$p = \frac{9}{25} = 0,36$$

a que corresponde uma probabilidade de 36%

- 1.2. Como o valor exato da média das alturas é 158 cm, temos que

$$\frac{150 \times 6 + 154 \times 3 + 156 \times 2 + 160 \times 10 + a \times 4}{25} = 158 \Leftrightarrow 3274 + 4a = 158 \times 25 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4a = 3950 - 3274 \Leftrightarrow a = \frac{676}{4} \Leftrightarrow a = 169$$

2. Como o terraço foi pavimentado com 400 ladrilhos quadrados, cada um com  $9 \text{ dm}^2$  de área, a área do terraço ( $A_T$ ) é dada por

$$A_T = 400 \times 9 = 3600 \text{ dm}^2$$

Como o mesmo terraço, pode ser pavimentado com 225 ladrilhos, iguais entre si, a área ( $A_L$ ) de cada um destes ladrilhos pode ser calculada como

$$A_L = \frac{3600}{225} = 16 \text{ dm}^2$$

Como estes ladrilhos são quadrados, o comprimento dos lados ( $l_L$ ) de cada um destes ladrilhos é

$$l_L = \sqrt{16} = 4 \text{ dm}$$

3. O conjunto  $A \cap \mathbb{Q}$  é o conjunto dos números que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, ou seja, os elementos do conjunto  $A$  que são números racionais.

Assim, como  $\sqrt{5}$  e  $\pi$  são dízimas infinitas não periódicas,  $\sqrt{6,25} = 2,5$  e  $\sqrt[3]{125} = 5$ , temos que apenas  $\sqrt{6,25}$  e  $\sqrt[3]{125}$  são números racionais, pelo que

$$A \cap \mathbb{Q} = \left\{ \sqrt{6,25}, \sqrt[3]{125} \right\}$$

Resposta: **Opção D**

4.

4.1. Como o lado  $[AB]$  é o lado que se opõe ao ângulo reto, no triângulo  $[ABD]$ , o lado correspondente, no triângulo  $[ABC]$ , é também o lado que se opõe ao ângulo reto, ou seja, o lado  $[AC]$

4.2. Tendo em conta os dados do enunciado podemos calcular  $A_{SC}$ , a área do semicírculo, como

$$A_{SC} = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi \times 5^2}{2} = \frac{25\pi}{2} \text{ cm}^2$$

Podemos igualmente calcular  $A_{[ABC]}$ , a área do triângulo  $[ABC]$ , observando que a medida da base é o dobro do raio ( $\overline{AC} = 2 \times r = 2 \times 5 = 10 \text{ cm}$ ), pelo que

$$A_{[ABC]} = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{2} = \frac{10 \times 4}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^2$$

E assim,  $A_S$ , a área sombreada é a diferença das áreas do semicírculo e do triângulo  $[ABC]$ , pelo que, fazendo os cálculos e arredondando o resultado às décimas, vem:

$$A_S = A_{SC} - A_{[ABC]} = \frac{25\pi}{2} - 20 \approx 19,3 \text{ cm}^2$$

5.

5.1. O volume total do sólido ( $V_T$ ) pode ser calculado como a soma dos volumes da semiesfera ( $V_{SE}$ ) e do cilindro ( $V_C$ ).

Calculando o volume da semiesfera, temos:

$$V_{SE} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2} = \frac{4\pi \times 3^3}{6} = \frac{4\pi \times 27}{6} = \frac{4\pi \times 27}{6} = 18\pi \text{ cm}^3$$

Podemos calcular  $A_o$ , a área da base do cilindro, como

$$A_o = \pi r^2 = \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

Assim, designado por  $\overline{BC}$  a altura do cilindro, o volume do cilindro  $V_C$ , é dado por

$$V_C = A_o \times h = 9\pi \times \overline{BC} \text{ cm}^3$$

Logo, como o volume total é  $258 \text{ cm}^3$ , temos que


$$V_T = V_{SE} + V_C \Leftrightarrow 258 = 18\pi + 9\pi \times \overline{BC} \Leftrightarrow 258 - 18\pi = 9\pi \times \overline{BC} \Leftrightarrow \frac{258 - 18\pi}{9\pi} = \overline{BC}$$

Pelo que o valor da altura do cilindro,  $\overline{BC}$ , arredondado às décimas é de

$$\overline{BC} \approx 8,1 \text{ cm}$$

5.2. A translação associada ao vetor  $\overrightarrow{BC}$  transforma o ponto  $B$  no ponto  $C$ , pelo que, da mesma forma, transforma o ponto  $A$  no ponto  $D$

Resposta: **Opção D**



---


**Caderno 2**

---

6. Usando as regras operatórias de potências, temos que:

$$\frac{3^{21} \times 3^{-7}}{(3^2)^5} = \frac{3^{21+(-7)}}{3^{2 \times 5}} = \frac{3^{14}}{3^{10}} = 3^{14-10} = 3^4$$

7. Representando o conjunto  $A \cap B$  na reta real, temos:



Assim temos que  $A \cap B = [0,4] \cup [3, +\infty[ = [3,4[$

Resposta: **Opção C**

- 8.
- Na turma A, a classificação com maior frequência relativa é 5, o que significa que a moda é 5.
  - Na turma B, a classificação com maior frequência relativa é 4, o que significa que a moda é 4.
  - Na turma A, as classificações iguais ou inferiores a 3, são  $10+10+20 = 40\%$  do total e as classificações iguais ou inferiores a 4 são  $10+10+20+20 = 60\%$  do total, o que significa que a mediana é 4.
  - Na turma B, as classificações iguais ou inferiores a 2, são  $20+20 = 40\%$  do total e as classificações iguais ou inferiores a 3 são  $20+20+20 = 60\%$  do total, o que significa que a mediana é 3.

Resposta: **Opção D**

9. Resolvendo a equação, vem:

$$\begin{aligned} \frac{x(x-4)}{4} = 9-x &\Leftrightarrow \frac{x^2-4x}{4} = 9-x \Leftrightarrow \frac{x^2-4x}{4} = \frac{9-x}{1} \stackrel{(4)}{\Leftrightarrow} \frac{x^2-4x}{4} = \frac{36-4x}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2-4x = 36-4x \Leftrightarrow x^2-4x+4x = 36 \Leftrightarrow x^2 = 36 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{36} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \pm 6 \Leftrightarrow x = 6 \vee x = -6 \end{aligned}$$

C.S. =  $\{-6, 6\}$

10. Resolvendo a inequação, temos

$$\begin{aligned} 1 - (3x - 2) < 4 + x &\Leftrightarrow 1 - 3x + 2 < 4 + x \Leftrightarrow -3x - x < 4 - 2 - 1 \Leftrightarrow -4x < 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4x > -1 \Leftrightarrow x > \frac{-1}{4} \Leftrightarrow x > -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

C.S. =  $\left] -\frac{1}{4}, +\infty \right[$



11. Como  $x$  é o número de narizes vermelhos vendidos e  $y$  é o número de ímanes vendidos pela companhia de circo, nesse dia, afirmar que «foram vendidos 96 objetos» pode ser traduzido por  $x + y = 96$ ; e se receberam «um total de 260 euros, este montante resultou da soma de 2 euros por cada nariz vermelho vendido e de 3 euros por cada íman vendido, pelo que podemos traduzir esta relação por  $2x + 3y = 260$

Assim, um sistema de equações que permite determinar o número de narizes vermelhos vendidos e o número de ímanes vendidos, pode ser

$$\begin{cases} x + y = 96 \\ 2x + 3y = 260 \end{cases}$$

12.

- 12.1. Como a função  $f$  é uma função de proporcionalidade direta, pode ser definida por uma expressão algébrica da forma  $f(x) = kx$ , com  $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Como  $f(2) = 4$ , temos que

$$4 = k \times 2 \Leftrightarrow \frac{4}{2} = k \Leftrightarrow 2 = k$$

Assim, vem que  $f(x) = 2x$ , pelo que

$$f(1) = 2 \times 1 = 2$$

- 12.2. Como  $f(2) = 4$ , o ponto de coordenadas (2,4) pertence ao gráfico da função  $f$ .

Como  $g(2) = 2^2 = 4$ , o ponto de coordenadas (2,4) também pertence ao gráfico da função  $g$ .

Assim, temos que o ponto  $A$  pertence ao gráfico da função  $f$  (a reta) e também ao gráfico da função  $g$  (a parábola).

Resposta: **Opção A**

13. Como a função  $h$  é definida por  $h(x) = x + 2$ , o seu gráfico é uma reta de declive 1. Como a reta  $r$  é uma reta de declive negativo, não pode ser o gráfico da função  $h$ .

Como a função  $h$  é definida por  $h(x) = x + 2$ , temos que  $h(0) = 0 + 2 = 2$ , ou seja, o ponto de coordenadas (0,2) pertence ao gráfico de  $h$ , logo a reta  $s$  não pode ser o gráfico de  $h$ , porque o ponto da reta  $s$  que tem abcissa zero, tem ordenada negativa.

14. Como o triângulo  $[ABC]$  é um triângulo retângulo em  $C$ , podemos, recorrer ao Teorema de Pitágoras, e afirmar que

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

Logo, substituindo os valores dados, e resolvendo a equação, vem que:

$$\begin{aligned} (a - 1)^2 &= (\sqrt{7})^2 + (a - 2)^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a + 1^2 = 7 + a^2 - 2 \times 2a + 2^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 = 7 + a^2 - 4a + 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a^2 - 2a - a^2 + 4a = 7 + 4 - 1 \Leftrightarrow 2a = 10 \Leftrightarrow a = \frac{10}{2} \Leftrightarrow a = 5 \end{aligned}$$



15. Uma esfera é o conjunto de pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo é igual **ou inferior** ao raio. Uma circunferência é o conjunto de pontos **do plano** cuja distância a um ponto fixo é igual ao raio. Uma circunferência é o conjunto de pontos **do plano** cuja distância a um ponto fixo é igual **ou inferior** ao raio.

Uma **superfície esférica** é o conjunto de pontos do espaço cuja distância a um ponto fixo é igual ao raio, pelo que o lugar geométrico dos pontos do espaço cuja distância ao ponto A é igual a 5 cm é uma superfície esférica de centro em A e raio 5 cm.

Resposta: **Opção B**

16.

- 16.1. Como o triângulo  $[ABC]$  é isósceles,  $\overline{AB} = \overline{BC}$ .

Como, num triângulo a lados iguais se opõem ângulos iguais, temos que  $B\hat{C}A = A\hat{C}B$ , e como estes são ângulos inscritos, os respetivos arcos também são iguais, ou seja  $\widehat{CB} = \widehat{BA}$

Como  $\widehat{AC} = 100^\circ$  e  $\widehat{AC} + \widehat{CB} + \widehat{BA} = 360^\circ$ , temos que

$$\widehat{AC} + \widehat{CB} + \widehat{BA} = 360 \Leftrightarrow 100 + 2 \times \widehat{CB} = 360 \Leftrightarrow 2 \times \widehat{CB} = 360 - 100 \Leftrightarrow \widehat{CB} = \frac{260}{2} \Leftrightarrow \widehat{CB} = 130$$

Como o ângulo  $CAB$  é o ângulo inscrito relativo ao arco  $CB$ , temos que  $2 \times C\hat{A}B = \widehat{CB}$ , pelo que

$$C\hat{A}B = \frac{\widehat{CB}}{2} \Leftrightarrow C\hat{A}B = \frac{130}{2} \Leftrightarrow C\hat{A}B = 65^\circ$$

- 16.2. O triângulo  $[ABD]$  é retângulo e  $[AD]$  e  $[BD]$  são os catetos.

Assim, como  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}}$ , temos que  $[AD]$  é o cateto oposto ao ângulo  $\alpha$ , e  $[BD]$  é o cateto adjacente, pelo que o ângulo  $\alpha$  é o ângulo  $ABD$

