

## EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)  
Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos

Duração da prova: 120 minutos  
2000

Época Especial

## PROVA ESCRITA DE MATEMÁTICA

## Primeira Parte

- As sete questões desta primeira parte são de escolha múltipla.
- Para cada uma delas, são indicadas quatro alternativas, das quais só uma está correcta.
- Escreva na sua folha de respostas a letra correspondente à alternativa que seleccionar para cada questão.
- Se apresentar mais do que uma resposta, a questão será anulada, o mesmo acontecendo se a letra transcrita for ilegível.
- Não apresente cálculos.

1. O conjunto dos zeros de uma função  $g$ , de domínio  $\mathbb{R}$ , é  $\{1, 2\}$ .  
Seja  $h$  a função, de domínio  $\mathbb{R}$ , definida por  $h(x) = g(x) \cdot (x - 3)^2$   
Quais são os zeros da função  $h$ ?

(A) 1, 2 e 3

(B) 1, 4 e 9

(C) 1,  $\sqrt{3}$  e 4(D)  $-\sqrt{3}$ , 1,  $\sqrt{3}$  e 2

2. Indique o valor de  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sin x}$


(A)  $-\infty$ 

(B) 0

(C) 1

(D)  $+\infty$





3. Na figura estão representados, em referencial o. n.  $Oxyz$ :
- o ponto  $A$ , de coordenadas  $(0, 0, 4)$
  - a superfície esférica de equação  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
  - a circunferência que resulta da intersecção dessa superfície esférica com o plano  $xOy$




Um ponto  $P$  percorre essa circunferência, dando uma volta completa.

Considere a função  $f$  que faz corresponder, à **abscissa** do ponto  $P$ , a **distância** de  $P$  a  $A$ .

Qual dos seguintes é o gráfico da função  $f$  ?




4. Na figura está parte da representação gráfica de uma certa função  $g$ , de domínio  $\mathbb{R}$ .




Em qual das figuras seguintes está parte da representação gráfica da função  $h$ , definida em  $\mathbb{R}$  por  $h(x) = -g(x) + 1$ ?


(A)




(B)



(C)



(D)



5. Admita que, numa certa escola, a variável «altura das alunas do 12.º ano de escolaridade» segue uma distribuição aproximadamente normal, de média 170 cm. Escolhe-se, ao acaso, uma aluna do 12.º ano dessa escola.

Relativamente a essa rapariga, qual dos seguintes acontecimentos é o mais provável?

- (A) A sua altura é superior a 180 cm                      (B) A sua altura é inferior a 180 cm  
(C) A sua altura é superior a 155 cm                      (D) A sua altura é inferior a 155 cm

6. Seja  $S$  o conjunto de resultados (com um número finito de elementos) associado a uma certa experiência aleatória.

Sejam  $A$  e  $B$  dois acontecimentos, contidos em  $S$ , nenhum deles impossível, nem certo.


Sabe-se que  $A \subset B$ .

Indique qual das afirmações seguintes é verdadeira ( $P$  designa probabilidade e  $\bar{A}$  e  $\bar{B}$  designam os acontecimentos contrários de  $A$  e de  $B$ , respectivamente).

- (A)  $P(A) > P(B)$     (B)  $P(A \cap B) = 0$   
(C)  $P(A \cup B) = 1$     (D)  $P(\bar{A}) \geq P(\bar{B})$

7. Seja  $z = yi$ , com  $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , um número complexo ( $i$  designa a unidade imaginária).

Qual dos quatro pontos representados na figura junta ( $A$ ,  $B$ ,  $C$  ou  $D$ ) pode ser a imagem geométrica de  $z^4$ ?



- (A) O ponto  $A$     (B) O ponto  $B$   
(C) O ponto  $C$     (D) O ponto  $D$

## Segunda Parte

Nas questões desta segunda parte apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os cálculos que tiver de efectuar e todas as justificações necessárias.

**Atenção:** quando não é indicada a aproximação que se pede para um resultado, pretende-se sempre o valor exacto.

1. O *AUTO-HEXÁGONO* é um stand de venda de automóveis.

1.1. Efectuou-se um estudo sobre as vendas de automóveis neste stand, o qual revelou que:

- 15% dos clientes compram automóvel com alarme e com rádio;
- 20% dos clientes compram automóvel sem alarme e sem rádio;
- 45% dos clientes compram automóvel com alarme (com ou sem rádio).

Um cliente acaba de comprar um automóvel.

1.1.1. A Marina, empregada do stand, que nada sabia das preferências desse cliente e não tomou conhecimento do equipamento do automóvel que ele tinha comprado, apostou que esse automóvel estava equipado com rádio, mas não tinha alarme.

Qual é a probabilidade de a Marina acertar? Apresente o resultado na forma de percentagem.


1.1.2. Alguém informou depois a Marina que o referido automóvel vinha equipado com alarme. Ela apostou, então, que o automóvel também tinha rádio.

Qual é a probabilidade de a Marina ganhar esta nova aposta? Apresente o resultado na forma de fracção irredutível.

1.2. Este stand, de forma hexagonal, tem uma montra que se situa num dos lados do hexágono (ver figura).

Pretende-se arrumar seis automóveis **diferentes** (dois utilitários, dois desportivos e dois comerciais), de tal forma que cada automóvel fique junto de um vértice do hexágono.

Supondo que se arrumam os seis automóveis ao acaso, qual é a probabilidade de os dois desportivos ficarem junto dos vértices que se encontram nas extremidades da montra? Apresente o resultado na forma de fracção irredutível.



2. Em Malmequeres de Baixo, povoação com **cinco mil** habitantes, ocorreu um acidente, que foi testemunhado por algumas pessoas.

Admita que,  $t$  horas depois do acidente, o número (expresso em **milhares**) de habitantes de Malmequeres de Baixo que sabem do ocorrido é, aproximadamente,

$$f(t) = \frac{5}{1 + 124e^{-0,3t}}, \quad t \geq 0$$

- 2.1. Sabendo que o acidente ocorreu às sete e um quarto da manhã de um certo dia, mostre que, à meia-noite desse mesmo dia, mais de metade da população de Malmequeres de Baixo já sabia do ocorrido.
- 2.2. Recorrendo exclusivamente a processos analíticos, estude a função  $f$  quanto à monotonia e quanto à existência de assíntotas ao seu gráfico. Interprete as conclusões a que chegou, no contexto do problema.

3. Considere a função  $g$ , de domínio  $\mathbb{R}$ , definida por

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x} & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{\text{sen } x}{2x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

- 3.1. Utilizando métodos exclusivamente analíticos, resolva as duas alíneas seguintes:
- 3.1.1. Estude a função  $g$  quanto à continuidade no ponto 0.  
(Deve indicar, justificando, se a função  $g$  é contínua nesse ponto, e no caso de não ser, se se verifica a continuidade à esquerda, ou à direita, nesse mesmo ponto.)
- 3.1.2. Considere a função  $h$ , de domínio  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ , definida por  $h(x) = \frac{1}{3x}$   
Mostre que, no intervalo  $[-1, 1000\pi]$ , os gráficos de  $g$  e de  $h$  se intersectam em 1001 pontos.
- 3.2. Dos 1001 pontos referidos na alínea anterior, seja  $A$  o que tem menor **abscissa positiva**. Utilizando a sua calculadora, determine as coordenadas desse ponto (apresente os valores na forma de dízima, arredondados às décimas).

**4.** Em  $\mathbb{C}$ , conjunto dos números complexos, considere

$$z_1 = 7 + 24i \quad (i \text{ designa a unidade imaginária})$$

**4.1.** Um certo ponto  $P$  é a imagem geométrica, no plano complexo, de uma das raízes quadradas de  $z_1$ . Sabendo que o ponto  $P$  tem abcissa 4, determine a sua ordenada.

**4.2.** Seja  $z_2 = cis \alpha$  com  $\alpha \in \left] \frac{3\pi}{4}, \pi \right[$

Indique, justificando, em que quadrante se situa a imagem geométrica de  $z_1 \times z_2$

**FIM**

## COTAÇÕES

**Primeira Parte..... 63**

Cada resposta certa .....	+9
Cada resposta errada.....	- 3
Cada questão não respondida ou anulada .....	0

Nota: Um total negativo nesta parte da prova vale 0 (zero) pontos.

**Segunda Parte ..... 137**

1. ....	32
1.1. ....	20
1.1.1. ....	10
1.1.2. ....	10
1.2. ....	12
2. ....	35
2.1. ....	15
2.2. ....	20
3. ....	49
3.1. ....	33
3.1.1. ....	15
3.1.2. ....	18
3.2. ....	16
4. ....	21
4.1. ....	10
4.2. ....	11

**TOTAL .....200**



## Formulário

### Áreas de figuras planas

Losango:  $\frac{Diagonal\ maior \times Diagonal\ menor}{2}$

Trapézio:  $\frac{Base\ maior + Base\ menor}{2} \times Altura$

Polígono regular:  $Semiperímetro \times Apótema$

Círculo:  $\pi r^2$  ( $r$  – raio)

### Áreas de superfícies

Área lateral de um cone:  $\pi r g$   
( $r$  – raio da base;  $g$  – geratriz)

Área de uma superfície esférica:  $4 \pi r^2$   
( $r$  – raio)

### Volumes

Prisma:  $Área\ da\ base \times Altura$

Cilindro:  $Área\ da\ base \times Altura$

Pirâmide:  $\frac{1}{3} \times Área\ da\ base \times Altura$

Cone:  $\frac{1}{3} \times Área\ da\ base \times Altura$

Esfera:  $\frac{4}{3} \pi r^3$  ( $r$  – raio)

### Trigonometria

$$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b}$$

### Complexos

$$(\rho \operatorname{cis} \theta) \cdot (\rho' \operatorname{cis} \theta') = \rho \rho' \operatorname{cis}(\theta + \theta')$$

$$\frac{\rho \operatorname{cis} \theta}{\rho' \operatorname{cis} \theta'} = \frac{\rho}{\rho'} \operatorname{cis}(\theta - \theta')$$

$$(\rho \operatorname{cis} \theta)^n = \rho^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

$$\sqrt[n]{\rho \operatorname{cis} \theta} = \sqrt[n]{\rho} \operatorname{cis} \frac{\theta + 2k\pi}{n}, k \in \{0, \dots, n-1\}$$

### Regras de derivação

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

$$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u' \quad (n \in \mathbb{R})$$

$$(\operatorname{sen} u)' = u' \cdot \cos u$$

$$(\operatorname{cos} u)' = -u' \cdot \operatorname{sen} u$$

$$(\operatorname{tg} u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$$

$$(e^u)' = u' \cdot e^u$$

$$(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a} \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$$

### Limites notáveis

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty \quad (p \in \mathbb{R})$$