

## Exame final nacional de Matemática A (2022, Época especial)

Proposta de resolução



1.

1.1. Como o vértice  $A$  pertence ao semieixo positivo  $Ox$  e o vértice  $F$  pertence ao semieixo positivo  $Oy$ , então a base  $[ABCDEF]$  do prisma pertence ao plano  $xOy$ .

Como o prisma hexagonal  $[ABCDEFGH IJKL]$  é reto, a base  $[GHIJKL]$  é paralela ao plano  $xOy$ , o seja o plano que contém esta face é definido por uma equação da forma  $z = k$ ,  $k \in \mathbb{R}$


Como o ponto  $M$ , equidistante de ambas as bases tem de cota 2, então a altura do prisma é  $2 \times 2 = 4$ , ou seja, a equação do plano que contém a face  $[GHIJKL]$  é  $z = 4$

Resposta: **Opção B**

- 1.2. Como as bases do prisma são hexágonos regulares, as faces laterais opostas são paralelas, pelo que os planos  $BCJ$  e  $LEF$  são paralelos, ou seja os respectivos vetores normais são colineares.

Observando a equação que define o plano  $BCJ$  podemos verificar que um vetor normal deste plano (e também do plano  $LEF$  é  $\vec{u} = (3, -\sqrt{3}, 0)$ , pelo que o plano  $LEF$  é da forma

$$3x - \sqrt{3}y + d = 0$$



Como o ponto  $B$  tem ordenada e cota nulas e pertence ao plano  $BCJ$ , determinamos a sua abcissa,  $x_B$ , substituindo as coordenadas conhecidas na equação do plano:

$$3x_B - \sqrt{3} \times 0 - 6 = 0 \Leftrightarrow 3x_B - 0 = 6 \Leftrightarrow x_B = \frac{6}{3} \Leftrightarrow x_B = 2$$


Como o ponto  $M$  é o centro do prisma, também é o ponto médio do segmento  $[BL]$ , e assim, temos que:  $L = M + \overrightarrow{BM}$

Determinando as coordenadas do vetor  $\overrightarrow{BM}$ , temos:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BM} &= M - B = \left( \frac{4}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right) - (2, 0, 0) = \left( \frac{4}{3} - \frac{6}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right) = \\ &= \left( -\frac{2}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right) \end{aligned}$$

Pelo que as coordenadas do ponto  $L$  são:

$$L = M + \overrightarrow{BM} = \left( \frac{4}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right) + \left( -\frac{2}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right) = \left( \frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, 4 \right)$$



Como o ponto  $L$  pertence ao plano  $LEF$ , substituindo as coordenadas na equação anteriormente identificada, podemos determinar o valor do parâmetro  $d$ :

$$3 \times \frac{2}{3} - \sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} + d = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{4 \times \sqrt{3}^2}{3} + d = 0 \Leftrightarrow 2 - 4 + d = 0 \Leftrightarrow -2 + d = 0 \Leftrightarrow d = 2$$

Assim, uma equação do plano uma equação cartesiana do plano  $LEF$ , na forma indicada, é:


$$3x - \sqrt{3}y + 0z + 2 = 0$$



2. Como qualquer triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo, temos que a medida da hipotenusa do triângulo é  $\overline{AC} = 4$ , e recorrendo às definições de seno e cosseno, para determinar as medidas da base ( $\overline{BC}$ ) e da altura ( $\overline{AB}$ ), vem:

$$\sin \alpha = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{\overline{BC}}{4} \Leftrightarrow \overline{BC} = 4 \sin \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{\overline{AB}}{4} \Leftrightarrow \overline{AB} = 4 \cos \alpha$$



Como o raio da circunferência é metade do respetivo diâmetro,  $r = \frac{\overline{AC}}{2} = \frac{4}{2} = 2$ , temos que a área da região é a diferença da área do semicírculo e da área do triângulo:

$$\begin{aligned} A &= \frac{A_o}{2} - A_{[ABC]} = \frac{\pi r^2}{2} - \frac{\overline{BC} \times \overline{AB}}{2} = \frac{\pi(2)^2}{2} - \frac{4 \sin \alpha \times 4 \cos \alpha}{2} = \frac{4\pi}{2} - 8 \sin \alpha \cos \alpha = \\ &= 2\pi - 4 \times 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2\pi - 4 \sin(2\alpha) \end{aligned}$$

3. Como o número deve ter 5 algarismos diferentes como os 6 algarismos de 0 a 5, e o algarismo das unidades deve ser 5, existe apenas uma alternativa para o algarismo das unidades.

Como o algarismo das dezenas de milhar não pode ser zero, nem 5 (que é o algarismo das unidades), existem 4 alternativas para este algarismo.

Para o terceiro algarismo escolhido, por exemplo o dos milhares, voltam a existir 4 alternativas, porque o zero já pode ser considerado nesta posição, e para as restantes duas posições existem, respetivamente 3 e 2 alternativas.

Assim, a quantidade de números que existem nas condições descritas, é:

$$4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 96$$

Resposta: **Opção D**

4. Determinando a probabilidade com recurso à regra de LaPlace, calculamos o quociente do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, sendo os casos possíveis equiprováveis.

Como a empresa tem 60 funcionários, o número de grupos de 4 funcionários que podem ser formados, sem sequência ou hierarquia, ou seja, o número de casos possíveis é  ${}^{60}C_4$ .

O número de funcionários que trabalham em regime presencial corresponde a 75% do total de trabalhadores (sendo excluídos os 25% que trabalham exclusivamente a distância), ou seja  $0,75 \times 60 = 45$ .

Como se pretende calcular a probabilidade de serem selecionados, no máximo, três funcionários que trabalham em regime presencial, podemos calcular o número de casos favoráveis pela diferença de todos os grupos que se podem constituir e o número de grupos que é constituído exclusivamente pelos funcionários que trabalham em regime presencial, ou seja  ${}^{60}C_4 - {}^{45}C_4$ .

Assim, recorrendo à regra de LaPlace, a probabilidade de serem selecionados, no máximo, três funcionários que trabalham em regime presencial, pelo menos, dois dias por semana, é:  $\frac{{}^{60}C_4 - {}^{45}C_4}{{}^{60}C_4}$



5. Como  $A$  e  $B$  são acontecimentos independentes, temos que

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Assim,

$$\begin{aligned} P(B) + P(A) \times (1 - P(B|A)) &= P(B) + P(A) \times \left(1 - \frac{P(B \cap A)}{P(A)}\right) && (1) \\ &= P(B) + P(A) - P(B \cap A) \\ &= P(B) + P(A) - P(A) \times P(B) && (2) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \times P(B) \\ &= P(A) + P(B) \left(1 - P(A)\right) \\ &= P(A) + P(B) \times P(\bar{A}) && (3) \end{aligned}$$

(1) Definição de probabilidade condicionada

(2) Hipótese:  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

(3) Teorema:  $P(\bar{X}) = 1 - P(X)$

Logo  $P(B) + P(A) \times (1 - P(B|A)) = P(A) + P(B) \times P(\bar{A})$  *q.e.d.*

6. Usando a definição do número  $e$ , temos que:

$$\lim u_n = \lim \left(\frac{n+k}{n}\right)^n = \lim \left(\frac{n}{n} + \frac{k}{n}\right)^n = \lim \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$$

Resposta: **Opção C**

7. De acordo com a enunciado, e com a definição de progressão aritmética, temos que:

- $v_3 = 1 \Leftrightarrow v_1 + 2r = 1 \Leftrightarrow v_1 = 1 - 2r$
- $v_{10} = v_1 + 9r = 1 - 2r + 9r = 1 + 7r$
- $v_9 = v_1 + 8r = 1 - 2r + 8r = 1 + 6r$

Desta forma, vem que a razão é:

$$\begin{aligned} v_{10} = \frac{5}{4}v_9 &\Leftrightarrow 1 + 7r = \frac{5}{4}(1 + 6r) \Leftrightarrow 1 + 7r = \frac{5}{4} + \frac{30r}{4} \Leftrightarrow 7r - \frac{30r}{4} = \frac{5}{4} - 1 \Leftrightarrow -\frac{2r}{4} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2r = 1 \Leftrightarrow r = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

E o primeiro termo é:  $v_1 = 1 - 2r = 1 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + 1 = 2$

Assim o termo geral da sucessão é:  $v_n = 2 - \frac{1}{2}(n - 1)$

Desta forma, resolvendo a equação  $v_n = -50$ , vem:

$$\begin{aligned} v_n = -50 &\Leftrightarrow 2 - \frac{1}{2}(n - 1) = -50 \Leftrightarrow -\frac{n}{2} + \frac{1}{2} = -50 - 2 \Leftrightarrow -\frac{n}{2} = -52 - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{n}{2} = -\frac{105}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow n = 2 \times \frac{105}{2} \Leftrightarrow n = 105 \end{aligned}$$

Como a solução da equação é um número natural, então  $-50$  é o termo de ordem 105 da sucessão  $(v_n)$ , ou seja,  $v_{105} = -50$



8. Como  $z = ee^{ie}$ , temos que:

- $|z| = e$ , pelo que o afixo de  $z$  é um ponto pertencente à circunferência de centro na origem e raio  $e$
- $\text{Arg}(z) = e$ , como  $e \approx 2,7$  temos que  $\pi < \text{Arg}(z) < \frac{\pi}{2}$ , pelo que o afixo de  $z$  é um ponto do 2.º quadrante.

Resposta: **Opção A**

9. Simplificando a expressão de  $z_1$ , como  $i^7 = i^{4+3} = i^3 = -i$ , temos que:

$$\begin{aligned} z_1 &= (1+i)^2 \times (2+i) + i^7 = (1+2i+i^2) \times (2+i) - i = 2i \times (2+i) - i = \\ &= (1+2i-1) \times (2+i) - i = 2i(2+i) - i = 4i + 2i^2 - i = 3i + 2(-1) = -2 + 3i \end{aligned}$$

Assim, podemos determinar o valor de  $z_2$ :

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 = 3+2i &\Leftrightarrow z_2 = \frac{3+2i}{z_1} \Leftrightarrow z_2 = \frac{3+2i}{-2+3i} \Leftrightarrow z_2 = \frac{(3+2i)(-2-3i)}{(-2+3i)(-2-3i)} \Leftrightarrow z_2 = \frac{-6-9i-4i-6i^2}{(-2)^2-(3i)^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z_2 = \frac{-6-11i-6(-1)}{4-9(-1)^2} \Leftrightarrow z_2 = \frac{-6+6-11i}{4+9} \Leftrightarrow z_2 = \frac{-11i}{11} \Leftrightarrow z_2 = -i \end{aligned}$$

Logo temos que:

$$z_2 = \text{sen } \theta + i \cos \theta \Leftrightarrow \text{sen } \theta + i \cos \theta = -i \Leftrightarrow \text{sen } \theta + i \cos \theta = 0 - i$$

Ou seja  $\text{sen } \theta = 0 \wedge \cos \theta = -1$ , pelo que  $\theta = \pi$

10. Para averiguar se a função  $f$  é contínua em  $x = 0$ , temos que verificar se  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

- $f(0) = \frac{3}{5}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{e^{5x} - 1} = \frac{3(0)}{e^{5(0)} - 1} = \frac{0}{e^0 - 1} = \frac{0}{0}$  (Indeterminação)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{e^{5x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{e^{5x} - 1}{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(e^{5x} - 1) \times \frac{5}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(e^{5x} - 1) \times \frac{5}{3}} =$$

(considerando  $y = 5x$ , temos que se  $x \rightarrow 0$ , então  $y \rightarrow 0$ )

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{(e^y - 1) \times \frac{5}{3}}{y}} = \frac{\lim_{y \rightarrow 0} 1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{(e^y - 1) \times \frac{5}{3}}{y}} = \frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{Lim. Notável}} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5}{3}} = \frac{1}{1 \times \frac{5}{3}} = \frac{3}{5}$$

Como  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ , então a função  $f$  é contínua em  $x = 0$ .



11.

11.1. Determinando a equação da assíntota vertical do gráfico de  $g$ , quando  $x \rightarrow +\infty$ , temos:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x) = \ln(1 + e^{+\infty}) - \infty = +\infty - \infty \text{ (Indeterminação)} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - \ln e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{1}{e^x} + \frac{e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{1}{e^x} + 1 \right) = \ln \left( \frac{1}{e^{+\infty}} + 1 \right) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0\end{aligned}$$

Logo a reta definida por  $y = 0$  é uma assíntota do gráfico de  $g$ , quando  $x \rightarrow +\infty$ Determinando o declive da assíntota oblíqua do gráfico de  $g$ , quando  $x \rightarrow -\infty$ , temos:

$$\begin{aligned}m &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^x) - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{\ln(1 + e^x)}{x} - \frac{x}{x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{\ln(1 + e^x)}{x} - 1 \right) = \frac{\ln(1 + e^{-\infty})}{-\infty} - 1 = \frac{\ln(1 + 0^+)}{-\infty} - 1 = \frac{0^+}{-\infty} - 1 = 0^- - 1 = -1\end{aligned}$$

Calculando o valor da ordenada na origem, temos que:

$$\begin{aligned}b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (g(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(1 + e^x) - x - (-1)x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(1 + e^x) - x + x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^x) = \ln(1 + e^{-\infty}) = \ln(1 + 0) = \ln 1 = 0\end{aligned}$$

Desta forma a equação reduzida da assíntota oblíqua do gráfico de  $g$ , quando  $x \rightarrow -\infty$ , é:

$$y = -1 \times x + 0 \Leftrightarrow y = -x$$



11.2. Determinando a expressão da função derivada, temos:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (g(x))' = (\ln(1 + e^x) - x)' = (\ln(1 + e^x))' - (x)' = \frac{(1 + e^x)'}{1 + e^x} - 1 = \frac{(1)' + (e^x)'}{1 + e^x} - 1 = \\ &= \frac{0 + e^x}{1 + e^x} - 1 = \frac{e^x}{1 + e^x} - 1 \end{aligned}$$

O declive da reta tangente ao gráfico de  $g$ , no ponto de abscissa 0, é dado por:

$$m = g'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} - 1 = \frac{1}{1 + 1} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Determinando a ordenada do ponto do gráfico de abscissa 0, temos:

$$g(0) = \ln(1 + e^0) - 0 = \ln(1 + 1) = \ln 2$$

Como o ponto de abscissa 0, também pertence à reta tangente, substituímos as coordenadas deste ponto e o declive da reta, em  $y = mx + b$ , para calcular o valor de  $b$ :

$$\ln 2 = -\frac{1}{2} \times 0 + b \Leftrightarrow \ln 2 = b$$

Desta forma, a equação da reta tangente ao gráfico de  $g$  no ponto de abscissa 0, é:

$$y = -\frac{1}{2} \times x + \ln 2 \Leftrightarrow y = -\frac{x}{2} + \ln 2$$

Assim, as coordenadas dos pontos  $A$  e  $B$ , são:

- $A(0, \ln 2)$  porque  $g(0) = \ln 2$
- $B(2 \ln 2, 0)$  porque  $0 = -\frac{x}{2} + \ln 2 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \ln 2 \Leftrightarrow x = 2 \ln 2$

E assim, a área do triângulo  $[OAB]$  é:

$$A_{[OAB]} = \frac{\overline{OA} \times \overline{OB}}{2} = \frac{\ln 2 \times 2 \ln 2}{2} = \frac{2(\ln 2)^2}{2} = (\ln 2)^2$$

12.

12.1. Considerando o ponto  $P$  como o ponto de interseção da reta  $s$  com o eixo  $Oy$  temos que as respetivas coordenadas são  $P(0, b)$ , sendo  $b$  para calcular a ordenada na origem da reta  $s$ .

Assim, temos que o declive da reta  $s$ , é:

$$m = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A} = \frac{b - 1}{0 - (-1)} = \frac{b - 1}{1} = b - 1$$

Como  $m = b - 1$ , temos que:

$$m = b - 1 \Leftrightarrow b = m + 1$$

Resposta: **Opção A**





- 12.2. Como o ponto  $C$  é projeção ortogonal do ponto  $B$  sobre o eixo  $Oy$ , as coordenadas do ponto  $C$  são  $(0, (m+1)^2)$ , e o valor de  $m$  para o qual a área do triângulo  $[ABC]$  é igual a 4, é a solução da equação:

$$\begin{aligned} A_{[ABC]} = 4 &\Leftrightarrow \frac{x_B \times (y_B - y_A)}{2} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{(m+1) \times ((m+1)^2 - 1)}{2} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (m+1)^3 - (m+1) = 8 \end{aligned}$$

Desta forma, visualizando na calculadora gráfica os gráficos das funções  $f(x) = (x+1)^3 - (x+1)$  e  $g(x) = 8$ , numa janela que permita a visualização da interseção dos dois gráficos, reproduzido na figura ao lado, e usando a funcionalidade da calculadora para determinar valores aproximados das coordenadas do ponto de interseção de dois gráficos, obtemos o valor aproximado (às centésimas) das coordenadas do ponto de interseção, cuja abscissa é o valor de  $m$  pretendido:

$$(1,17; 8)$$

Assim, o valor arredondado às centésimas de  $m$  para o qual a área do triângulo  $[ABC]$  é igual a 4, é 1,17.







13. Para estudar o sentido das concavidades e a existência de pontos de inflexão, começamos por determinar a expressão da segunda derivada:

$$\begin{aligned} g''(x) &= (g'(x))' = \left( \frac{x - e^{3x}}{x} \right)' = \frac{(x - e^{3x})'(x) - (x - e^{3x})(x)'}{x^2} = \frac{((x)' - (3x)'e^{3x})(x) - (x - e^{3x}) \times 1}{x^2} = \\ &= \frac{(1 - 3e^{3x})(x) - (x - e^{3x})}{x^2} = \frac{x - 3xe^{3x} - x + e^{3x}}{x^2} = \frac{-3xe^{3x} + e^{3x}}{x^2} = \frac{e^{3x}(-3x + 1)}{x^2} \end{aligned}$$

Determinando os zeros da segunda derivada, vem:

$$\begin{aligned} g''(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{e^{3x}(-3x + 1)}{x^2} = 0 \Leftrightarrow e^{3x}(-3x + 1) = 0 \wedge \underbrace{x^2 \neq 0}_{\text{PV, } x > 0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \underbrace{e^{3x} = 0}_{\text{Cond. impossível}} \vee -3x + 1 = 0 \Leftrightarrow 1 = 3x \Leftrightarrow \frac{1}{3} = x \end{aligned}$$

Assim, estudando a variação de sinal de  $g''$  e relacionando com o sentido das concavidades do gráfico de  $g$ , vem:

$x$	0		$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$e^{3x}$	n.d.	+	+	+
$-3x + 1$	n.d.	+	0	-
$x^2$	n.d.	+	+	+
$g''$	n.d.	+	0	-
$g$	n.d.		Pt. I.	

Logo, podemos concluir que o gráfico de  $g$ :

- tem a concavidade voltada para baixo no intervalo  $[\frac{1}{3}, +\infty[$
- tem a concavidade voltada para cima no intervalo  $]0, \frac{1}{3}]$
- tem um único ponto de inflexão, cuja abcissa é  $x = \frac{1}{3}$ .

14. As soluções da equação pertencem ao conjunto  $\{x \in \mathbb{R} : 9x + 1 > 0 \wedge 6x > 0\}$

Como  $9x > -1 \wedge 6x > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{9} \wedge x > 0 \Leftrightarrow x > 0$ , temos que  $x \in ]0, +\infty[$ , e resolvendo a equação, vem que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log_2(9x + 1) = \log_2(6x) &\Leftrightarrow \log_2(9x + 1) = 2 \log_2(6x) \Leftrightarrow \log_2(9x + 1) = \log_2(6x)^2 \Leftrightarrow 9x + 1 = (6x)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 9x + 1 = 36x^2 \Leftrightarrow -36x^2 + 9x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4(-36)(1)}}{2 \times (-36)} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{-9 + 15}{-72} \vee x = \frac{-9 - 15}{-72} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{12} \vee x = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Assim, como  $x > 0$ ,  $x = -\frac{1}{12}$  não é solução da equação, pelo que o conjunto dos números reais que são solução da equação, é:  $\left\{ \frac{1}{3} \right\}$



15. Começamos por determinar a expressão da derivada da função  $f$ , para estudar a monotonia da função e a existência de extremos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sqrt{kx} - \ln(kx))' = (\sqrt{kx})' - (\ln(kx))' = ((kx)^{\frac{1}{2}})' - \frac{(kx)'}{kx} = \frac{1}{2} \times (kx)^{1-\frac{1}{2}} \times (kx)' - \frac{k}{kx} = \\ &= \frac{1}{2} \times (kx)^{-\frac{1}{2}} \times k - \frac{k}{kx} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{kx}} \times k - \frac{k}{kx} = \frac{k}{2\sqrt{kx}} - \frac{k}{kx} = \frac{k^2x - 2k\sqrt{kx}}{2kx\sqrt{kx}} = \\ &= \frac{k(kx - 2\sqrt{kx})}{k \times 2x\sqrt{kx}} \stackrel{k \neq 0}{=} \frac{kx - 2\sqrt{kx}}{2x\sqrt{kx}} \end{aligned}$$

Calculando os zeros da derivada da função  $f$ , temos:

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{kx - 2\sqrt{kx}}{2x\sqrt{kx}} = 0 \Leftrightarrow kx - 2\sqrt{kx} = 0 \wedge \underbrace{2x\sqrt{kx} \neq 0}_{\text{Cond. universal para } x > 0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow kx = 2\sqrt{kx} \Rightarrow (kx)^2 = (2\sqrt{kx})^2 \Leftrightarrow (kx)^2 = 4kx \Leftrightarrow \frac{(kx)^2}{kx} = 4 \stackrel{kx \neq 0}{=} kx = 4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{k} \end{aligned}$$

Estudando a variação do sinal da derivada e relacionando com a monotonia da função, vem:

$x$	0		$\frac{4}{k}$	$+\infty$
$kx - 2\sqrt{kx}$	n.d.	-	0	+
$2x\sqrt{kx}$	n.d.	+	+	+
$f'$	n.d.	-	0	+
$f$	n.d.	$\searrow$	min	$\nearrow$

Assim, podemos concluir que a função  $f$  tem um mínimo absoluto em  $x = \frac{4}{k}$  porque é decrescente no intervalo  $]0, \frac{4}{k}[$  e crescente no intervalo  $]\frac{4}{k}, +\infty[$ .

O valor do mínimo é:

$$f\left(\frac{4}{k}\right) = \sqrt{k \times \frac{4}{k}} - \ln\left(k \times \frac{4}{k}\right) = \sqrt{4} - \ln 4 = 2 - \ln 4$$

Como a função é contínua, porque é o produto, a diferença e a composição de funções contínuas, e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{kx} - \ln(kx)) = \sqrt{0 \times x} - \ln(0^+ \times x) = \sqrt{0} - \ln(0^+) = 0 - (-\infty) = +\infty$$

então o contradomínio de  $f$  é

$$D'_f = ]2 - \ln 4, +\infty[$$

